

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
Inoceramus — ?	Infra-lias.	Fontasses, commune de Corbès (arrondissement. d'Alais). Coll. Liouère.
Pecten Pollux , d'Orb., <i>Prodr. Siném.</i> , n° 135.	Infra-lias.	Bildoire; — Molière.
Pecten Valoniensis , DeFrance.	Infra-lias.	Molière; — Le Pradel. A. C.
Pecten disparilis , Quenst., pl. 4, fig. 89.	Infra-lias.	Gammal; — Rouviouse; — l'Habitarelle, près des Salles-du-Gardon, T. R.
Pecten Thiollierei , Martin.	Infra-lias.	L'Habitarelle, près des Salles-du-Gardon.
Pecten cloacinus , Quenstedt, p. 31, pl. 1, fig. 33, 34.	Infra-lias.	Clet, près de Meyrannes; — Majencoule; l'Habitarelle; — Salindres; — Gammal; — Chaylard. C.
Pecten œquivalvis , Sow.; Goldf., pl. 89, fig. 4; d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 209.	Lias moyen.	La Can de l'Hospitalet; — Bleygard (Lozère); — Combalbert; — La Fage.
Pecten priscus , Schloth.; Zieten, pl. 52, fig. 3; d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 211.	Lias moyen.	La Valestalière.
Pecten pumilus , Lamk.; d'Orb., <i>Prodr. Toarcien.</i> , n° 247 = Pecten personatus , Goldf., p. 68, pl. 52, fig. 2.	Marnes supra-lias.	Perjuret, T. R. coll. Liouère.
Pecten velatus , Goldf., <i>Petrefact. German.</i> , 2, p. 45, pl. 90, fig. 2; d'Orb., <i>Toarcien</i> , n° 248.	Marnes supra-lias.	Fressac.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
<i>Pecten acuticosta</i> , Lamk.; d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 250.	Marnes supra-lias.	Trèves, roc de Rigaldis en montant à Espinassous. (coll. Lioure).
<i>Plicatula ventricosa</i> , Münster, Goldf., 2, p. 101, pl. 107, fig. 3.	Infra-lias.	Molière; — Chaylard.
<i>Plicatula Oceani</i> , d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>Sinemur.</i> , n° 138.	Infra-lias.	Clot, près Meyrannes; — la Barèze, près Privas.
<i>Plicatula spinosa</i> , Sow.; d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 215. D'après A. Opper, <i>Die Jura</i> <i>formation</i> , p. 104, le <i>Plicatula</i> <i>ventricosa</i> est une espèce pro- pre à la zone de l' <i>Ammonites</i> <i>oxynotus</i> ; le vrai <i>P. spinosa</i> appartiendrait au liasien, tan- dis que d'Orbigny le cite dans le sinémurien et dans le lia- sien.	Marnes supra-lias. Partie inférieure.	La Cañ-de-l'Hospitalet, au- dessus de Montaigu; — Cazic, près de Nant.
<i>Plicatula Neptuni</i> , d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>Toarcien</i> , n° 259.	Marnes supra-lias.	Fressac.
<i>Ostrea irregularis</i> , Münster, Goldf., p. 20, pl. 79, fig. 5.	Infra-lias.	Chaylard. T. C. On observe toujours un point d'attache au-dessous et vers le sommet de la valve inférieure. La figure de Goldfuss indique très-bien cette particularité.
<i>Ostrea rugata</i> , Quenstedt, <i>Der</i> <i>Jura</i> , pl. 3, fig. 17, 18.	Infra-lias.	Salindres; — Chaylard; — Gammal; T. R. Cette espèce est très-distincte de la précédente: elle a l'aspect d'une véritable Gryphée, c'est-à- dire qu'elle a l'extrémité infé- rieure saillante et fortement re- courbée en forme de bec. — Je rapporte cette espèce à la figure

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
		de Quenstedt bien que celle-ci soit très-mauvaise; cependant la description s'y rapporte assez bien. — Une particularité digne de remarque, c'est que le point d'attache de la coquille est toujours placée sur le sommet du bec recourbé, de manière à maintenir la coquille dans une position horizontale.
<p>Ostrea arcuata (<i>Gryphæa incurva</i>) Sow. ; <i>Gryphæa arcuata</i>, Lamk. ; d'Orb., <i>Prodr. Siném.</i>, n° 139.</p> <p>Albert Oppel, <i>Die Jura formation</i>, p. 105, considère avec raison la <i>Gryphæa obliquata</i> Sow. = <i>G. obliqua</i>, Goldf., et <i>G. Mac-Cullochii</i>, Zieten, comme une espèce distincte de l'<i>Ostrea (gryphæa) arcuata</i>, Lamk.</p>	Lias infér. et Lias moyen.	Monoblet ; — Lafage ; — Meyrannes ; Durfort.
Ostrea calceola , Quenstedt	Marnes supra-lias.	Fressac. T R. coll. Lioure.
Gryphæa obliquata , Sow. <i>Min. Conch.</i> tab. 112, fig. 3 ; Syn : <i>G. obliqua</i> , Goldf., pl. 85, fig. 2.	Lias moyen.	Bois de Valz ; — Meyrannes ; — M ^t de la Sube ; — Carnoulès.
Gryphæa cymbium , Lamk., Syn. : <i>Ostrea cymbium</i> , d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 217.	Lias moyen.	Durfort ; — Robiac ; — Mialet ; — Cezas ; Château-de-Sauvages (Alais).