

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Ter. bucculenta</i> , Sow., <i>Min. conch.</i> , pl. 438, fig. 3, 4; d'Orb., <i>Prodr. corallien</i> , n° 391. = <i>Ter. carinata</i> , Leym., <i>Stat. de l'Aube</i> , pl. 10, fig. 6.	Corallien.	Bois de Mounier, commune de Pompignan. C.
<i>Ter. equestris</i> , d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 393.	Corallien.	Bois de Mounier, au col de l'Ermitage, revers sud. A. R.
<i>Ter. substriata</i> , Schloth; d'Orb., <i>Prodr. corallien</i> , n° 388.	Corallien.	Bois de Mounier, au col de Ferrières, versant nord. T. R.
<i>Ter. Chauviniana</i> ?, d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 247.	Oxf. 2° étage.	Gornières, près le Clot.
<i>Ter. lacunosa</i> , Schloth., 1813, <i>Rhynchonella lacunosa</i> , d'Orb., <i>Prodr. oxford.</i> , n° 457.	Oxf. 2° étage et oolit. infér.	Sumène; — Vissec, sur le chemin de Lafoux; — Rogues; C. Vallatoujès et Fonsanche. La Voulte.
<i>Smithyris spinosa</i> , d'Orb., <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 447 = <i>Terebratula spinosa</i> , Phill., pl. 9, fig. 18; Zieten, pl. 44, fig. 1; De Buch, <i>Mém. de la Soc. géol.</i> , 3, p. 161, pl. 16, fig. 4.	Oolite infér.	Roc de la Fourque (Madières); mas du Bos et aux Tavillons, près Anduze; — château d'Arène, comm. de Saint-Christol. T. R.
<i>Rhynchonella Astieriana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr. terr. crét.</i> , pl. 492, fig. 1-4, et <i>Prodr. corallien</i> , n° 386.	Corallien.	La Séranne (Hérault).
<i>Ter. inconstans</i> , d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 383. <i>Pal. fr.</i> = <i>Terebratula inconstans</i> , Sow., <i>Min. conch.</i> , pl. 277, fig. 2-4; = <i>Ter. corallina</i> , Leym., <i>Stat. de l'Aube</i> , pl. 10, fig. 16.	Corallien.	La Séranne, au Coulet (Hérault); Bois de Mounier, près Pompignan.
<i>Ter. plicatella</i> , d'Orb., 1847, <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 286.	Ool. infér. sous-étage a.	Variété plus allongée que le type: Les Tavillons, près le Bos (Anduze). A. C.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
Thyn. tetraedra , d'Orb., 1847 = <i>Terebr. tetraedra</i> , Sow., 1815, <i>Min. conch.</i> , 1, p. 189, pl. 83, fig. 4; d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 265.	Ool. inf. Sous-étage b.	Blateiras, près Anduze.

Mollusques Briozoaires.

Spiropora cespitosa , Michelin, <i>Ico-nog. Zooph.</i> , pl. 56, fig. 1 = <i>Entalophora cespitosa</i> , Lamou-roux, 1821, <i>Expos. method. des polyp.</i> , p. 85, pl. 82, fig. 11-12. — D'Orb., <i>Prodr. Bathonien</i> , n° 388, et <i>Pal. franç., Terr. cré.</i> , 5, p. 779.	Oolite infér.	Roc de la Fourque, près Ma-dières; Cazevieille, près d'Alzon.
Columnaria sulcata , Goldf., p. 72, t. xxiv, fig. 9, a, b, c.	Corallien.	Bois de Ferrières (Hérault). Bois de Mounier, commune de Pompignan.
Poteriocrinites ou Syringopora , Goldf.	Corallien.	Cazalet.

Echinodermes.

Desorella Orbignyana , Cotteau, <i>Echin. foss.</i> , p. 227, pl. 23, fig. 9-11.	Corallien.	Col de l'Ermitage, au bois de Mounier, commune de Pompi-gnan, T. R. (exempl. unique en mauvais état; coll. Lièvre).
Collyrites capistrata , Desmoul, <i>Tabl. Syn.</i> p. 366; Desor, <i>Synops.</i> p. 208.	Oxford. 2° étage.	La Tessonne, au-dessus du pont de la Paro; — Rogues; — Sumène; — Vissec. C.
Pedina rotata , Wright.; = <i>P. sublaevis</i> , Agass., <i>Echin. suiss.</i> , 2, p. 34, tabl. 15, fig. 8-13.	Ool. infér.	Mas du Bès, près Anduze. T. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
Rhabdocidaris maxima , Desor, <i>Synops. des Echin.</i> , p. 40, pl. 8; = <i>Cidaris spinulosa</i> Roemer, Cott. et Triger., <i>Ech.</i> , pl. II, fig. 6, 7.	Ool. infér. couche supér. du calc. à Entroques, servant de passage à l'oxf.	Saint-Brès, au quartier de Montchaud, près Dieuse; — Pied-pouchut, près Meyrueis.
Rhabd. Remus , Desor, <i>Synops</i> , pl. 9, fig. 1.	Oxford.	Naves (Ardèche).
Cidaris horrida? , Mérian; d'Orb., <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 515, Agass., <i>Cat.</i>	Ool. infér. Sous-étage b.	L'Arbousset, près d'Anduze; — Saint-Brès, au quartier des Buisnières.
Cid. Euthymei , Nobis. Radioles rappelant la forme de celles du <i>C. scrobiculata</i> , Braun, mais avec des granules linéaires.	Oxf. marn.	Saint-Brès, près le hameau de Dieuse, au quartier de Montchaud.
Cid. filograna , Agass.; Desor <i>Synops.</i> , pl. 3, fig. 12, a, b.	Oxf. marneux partie tout à fait infér.	Saint-Brès, près Dieuse, quartier de Montchaud, A. R.; — Vallatoujès, près Saint-Hippolyte-le-Fort, A. R.
Cid. Roisyi , Desor, <i>Synops.</i> , pl. IV, fig. 12.	Oolit. infér.	Cité par M. Desor, à Privas (Ardèche).
Pentacrinus Bajocensis , d'Orb., <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 522.	Ool. infér. sous-étage b.	De la maison Viau, près Lavoulte; — l'Arbousset, près Anduze; — les Mages; — Saint-Brès. T. C.
Pentacrinus cylindricus , d'Orb., <i>Prodr. oxford.</i> , n° 589.	Oxford. 2 ^e étage.	Rogues; — Cazalet; Naves.
Millecrinus ou Apiocrinus	Marnes oxf.	Vallatoujès.