

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Turritella granulatoïdes</i> , d'Orb., 1847, = <i>T. granulata</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 46, pl. 152, fig. 5-7 et <i>Prodr. Tur.</i> , n° 25.	Calc. jaune. (Turonien).	Château des Aupiats, commune de Saint-Marcel-de-Carreiret: — Gibol (arrondissement d'Alais), au quartier des Ferrières.
<i>Turritella Verneuiliana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 47, pl. 153, fig. 8-9 et <i>Prodr. Tur.</i> , n° 26.	Calc. jaune. (Turonien).	Château des Aupiats près Saint-Marcel-de-Carreiret, C. — Gibol, au quartier des Ferrières; — Rivière; — Brouzet et Saint-Jean-de-Marvejols (arrondissement d'Alais), T. C.
<i>Turritella Requieniana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 152, fig. 5-6; et <i>Prodr. Tur.</i> , n° 24.	Ucétien.	Au Nord du village de Chusclan, quartiers du Sablas et du Peyrau, sous le roc de la Folle; — Verfeuil, au pied de Montgrand. T. R.
<i>Ampullaria Faujasii</i> , nobis; <i>Mémoires de Faujas de Saint-Fond</i> , <i>Ann. du muséum</i> , t. xiv, pl. 19, fig. 1-6.	Paulétien.	Dans toutes les exploitations de lignite de l'arrondissement d'Uzès, surtout à Saint-Paulet, Connaux. T. C. Au Banc-Rouge (Ardèche) A. R.
<i>Melania Pauletii</i> , nobis; <i>Mém. de Faujas</i> , etc..., t. xiv, pl. 19, fig. 7-10.	Paulétien.	Saint-Paulet.
<i>Melania Faujasii</i> , nobis; <i>Mém. de Faujas</i> , etc..., t. xiv, pl. 19, fig. 11-12.	Paulétien.	Saint-Paulet.
<i>Valvata Faujasii</i> , nobis; <i>Mém. de Faujas</i> , etc..., t. xiv, pl. 19, fig. 13-17.	Paulétien.	Saint-Paulet.
<i>Nerinea Requieniana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 94, pl. 163, fig. 1-3 et <i>Prodr. Tur.</i> , n° 35.	Turonien et Ucétien.	Sur le serre de Bernon, commune de Tresque. T. C. Moure de George, près Chusclan.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<p><i>Nerinea trochiformis</i>, d'Hombres-Firmas, 1839, <i>Itc. de mém. et d'obs.</i>, 4^e partie, p. 238, pl. vi, fig. 1, 2, et <i>Mém. de l'Acad. du Gard</i>, 1839, p. 116, fig. 1, 2. = <i>N. brevis</i>, d'Orb., 1842 (par erreur d'Hombres) <i>Pal. fr.</i>, 2, p. 92, pl. 162, fig. 3, 4 et <i>Prodr. Tur.</i>, n° 33.</p>	Calcaire à Hippurites.	<p>Gatigues, commune d'Aigaliers, C. ; — La Roque, surtout sur le serre de Martin, C. — Près la tuilerie de Boisson, commune d'Allègre (Alais); — Vagnas (Ardèche), C.</p> <p>Cette espèce est très-caractéristique de l'étage à Hippurites et se trouve associée à l'<i>Hippurites organisans</i>.</p>
<p><i>Pyramidella canaliculata</i>, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 2 p. 104, pl. 164, fig. 3-6; et <i>Prodr. Tur.</i>, n° 40.</p>	Turonien.	<p>Saint-Laurent-la-Vernède, au quartier de Roquevinière; — au-dessous de la-Bastide-d'Engras, à droite le long du chemin. T. C. — Gibol, commune d'Allègre, (arrondissement d'Alais). A. R.</p>
<p><i>Pyramidella inflata</i>, nobis. Cette espèce, voisine de la précédente, a le dernier tour de spire beaucoup plus large et beaucoup plus renflé.</p>	Turonien.	<p>Gibol, commune d'Allègre arrondissement d'Alais. A. R.</p>
<p><i>Acteonella Amellæ</i>, nobis. pl. 2, fig. 4.</p>	Calc. gris. (Turonien).	<p>Vallon de Vaillen, près Saint-Alexandre.</p>
<p><i>Acteonella gigantea</i>, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, pl. 165 et <i>Prodr. Sénon.</i>, n° 178.</p>	Ucétien.	<p>Chusclan, au quartier du Moine. R.</p>
<p><i>Avellana Subincrassata</i>, d'Orb., <i>Prodr. alb.</i>, n° 125. = <i>A. incrassata</i>, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 2, pl. 168, fig. 13-16; — Pictet et Roux, <i>Descript.</i>, pl. 16, fig. 6.</p>	Gault proprement dit. (Albien).	<p>Pradon. R.</p>
<p><i>Avellana Hugardiana</i>, d'Orb., <i>Prodr. alb.</i>, n° 126, et <i>Pal. fr.</i>, 2, pl. 168, fig. 17-19.</p>	Gault. (id).	<p>Pradon. R.</p>

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<p><i>Pterodonta inflata</i>, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 2, p. 318, pl. 219, et <i>Prodr. Cénom.</i>, n° 86. Cité à tort par d'Orbigny comme se trouvant à Orango dans le Cénomanién : l'exemplaire figuré par lui de la collection Requier, comme venant d'Uchaux, provient des couches Turoniennes. L'étage Cénomanién ne se montre pas dans cette localité.</p>	Calc. gris. (Turonien).	M ^e du Camp de César, au-dessous de l'église Saint-Pierre.
<p><i>Pterodonta ovata</i>, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 2, p. 218, fig. 3, et <i>Prodr. Sénon.</i>, n° 189.</p>	Calc. gris. (Turonien).	M ^e du Camp de César, au-dessous de l'église Saint-Pierre.
<p><i>Pterodonta intermedia</i>, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 2, p. 319, pl. 220, fig. 1, et <i>Prodr. Sénon.</i>, n° 190.</p>	Calc. gris. (Turonien).	M ^e du Camp de César, au-dessous de l'église Saint-Pierre ; Saint-André-de-Roquepertuis, dans le vallon de l'Issart.
<p><i>Pterodonta naticoides</i>, d'Orb., <i>Prodr. Tur.</i>, n° 47.</p>	Calc. gris. (Turonien).	Camp de César, au-dessous de Saint-Pierre.
<p><i>Natica Gaultina</i>, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 2, p. 156, pl. 173, fig. 3 et <i>Prodr. alb.</i>, n° 131.</p>	Gault. (Albien).	Pradon ; — Jarriguette.
<p><i>Natica lyrata</i>, Sow. ; d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 2, p. 161, pl. 172, fig. 5 et <i>Prodr. Tur.</i>, n° 49.</p>	Turonien.	Gibol, quartier de Ferrière, commune d'Allègre (arrondissement d'Alais). R.
<p><i>Natica Clementina</i>, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 2, p. 154, pl. 172, fig. 4 et <i>Prodr. alb.</i>, n° 129 ; Picotet et Roux, <i>Descript.</i>, pl. 17, fig. 1.</p>	Gault proprement dit. (Albien).	Pradon. R.
<p><i>Natica excavata</i>, Michelin ; d'Orb., <i>Prodr. alb.</i>, n° 130 et <i>Pal. fr.</i>, 2, p. 155, pl. 173, fig. 1, 2 ; Picotet et Roux, <i>Descript.</i>, pl. 18, fig. 3.</p>	Gault. (id).	Hudeau. T. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Natica truncata</i> , Pictet et Roux, <i>Descript.</i> , pl. 18, fig. 2; d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 134.	Gault proprement dit. (Albien).	Hudeau, R.
<i>Solarium subornatum</i> , d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 140; = <i>S. ornatum</i> , Fitton; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 199, pl. 180, fig. 1-4; Pictet et Roux, <i>Descript.</i> , pl. 20, fig. 3.	Gault. (id.)	Pradon; — Hudeau; — Jarriguette. T. C.
<i>Turbo Montmolini</i> , Pictet et Roux, <i>Descript.</i> , pl. 19, fig. 6; d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 157 ^e .	Gault. (id.)	Jarriguette. T. R.
<i>Phasianella supracretacea?</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 234, pl. 187, fig. 4, et <i>Prodr. Sénon.</i> , n° 267.	Cénomaniens.	Cabaressc. C.
<i>Pleurotomaria Pailletteana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 241, pl. 189, et <i>Prodr. néoc. A.</i> , n° 142.	Aptien inférieur.	Laval-Saint-Roman, dans la Combe de Mars; — Baron, à Courmet; — Montaren, lit de la rivière de Seynes. R.
<i>Pleurotomaria Gibsii?</i> d'Orb., 1847, <i>Prodr. alb.</i> , n° 161, <i>Trochus Gibsii</i> , Sow. = <i>P. gurgites</i> , d'Orb., 1842, <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 249, pl. 192, fig. 4-6.	Gault. (id.)	Jarriguette. R.
<i>Pleurotomaria Rhodani</i> , d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 162, et <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 250, pl. 192, fig. 7, 8; Pictet et Roux, <i>Descript.</i> , pl. 24, fig. 1.	Gault. (id.)	Pradon; — Jarriguette; — Cabaressc. T. R.
<i>Pleurotomaria Saussureana</i> , Pictet et Roux, <i>Descript.</i> , pl. 23, fig. 1.	Gault. (id.)	Hudeau. T. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Pleurotomaria Alpina</i> , d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 163; et <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 273; Pictet et Roux, pl. 22, fig. 4.	Gault proprement dit. (Albien).	Pradon. T. R.
<i>Pleurotomaria regina?</i> , Pictet et Roux, <i>Descrip.</i> , pl. 24, fig. 2; — d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 166 ^o .	Gault. (id.)	Pradon. R.
<i>Valuta Guerangeri?</i> d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 221, fig. 1, 2, et <i>Prodr. Cénom.</i> , n° 170 ^o .	Calcaire gris. (Turonien).	Serre de Bernon, près Tresque. T. R. Réc. par M. Allard, instituteur à Saint-Géniès-de-Comolas.
<i>Valuta N. S.</i> voisine du <i>N. Guerangeri</i> .	Ucétien.	Chusclan, au quartier du Peyrau, sous le roc de la Folle. T. R.
<i>Rostellaria Gargasensis</i> , d'Orb., <i>Prodr. apt.</i> , n° 73.	Aptien infér.	Saint-Christol-de-Rodières.
<i>Rostellaria costata</i> , Michelin; d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 173; = <i>R. Parkinsoni</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 288, pl. 208, fig. 1, 2; <i>R. Orbignyana</i> , Pictet et Roux, <i>Descrip.</i> , pl. 24, fig. 4.	Gault proprement dit. (Albien).	Jarriguette; — Pradon; — Hudeau (commune de Salazac).
<i>Rostellaria Neckeriana?</i> , Pictet et Roux, <i>Descrip.</i> , pl. 25, fig. 3; d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 176 ^o .	Gault. (id.)	Jarriguette. T. R.
<i>Rostellaria Itieriana?</i> , d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 175 et <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 298; Pictet et Roux, <i>Descrip.</i> , pl. 25, fig. 9.	Gault. (id.)	Hudeau (commune de Salazac); — Pradon.
<i>Rostellaria ornata</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 291, pl. 209, fig. 1, 2, et <i>Prodr. Tur.</i> , n° 76.	Turonien.	Allègre, près le hameau de Gibol, arrondissement d'Alais. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
Strombus....	Gault. (Albien).	Pradon. T. R.
<i>Fusus Sabaudianus</i> , Pictet et Roux, <i>Descrip.</i> , pl. 26, fig. 7 et pl. 27, fig. 2; d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 186 ^e .	Gault. (id.)	Pradon; — Jarriguette. C.
<i>Fusus Dupinianus</i> ?, d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 334, pl. 222, fig. 6-7, et <i>Prodr. alb.</i> , n° 177.	Gault. (id.)	Pradon. T. R.
<i>Fusus</i>	Gault. (id.)	Forêt de Hudeau.
<i>Cerithium Derignyanum</i> , Pictet et Roux, <i>Descrip.</i> , pl. 27, fig. 4; d'Orb., <i>Prodr. alb.</i> , n° 196 ^e .	Gault. (id.)	Pradon; — Jarriguette; — Cabarese. T. R.
<i>Cerithium Matheronii</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 2, p. 379, pl. 232, fig. 7, et <i>Prodr. Turonien</i> , n° 87.	Paulétien.	Près du hameau de Montèzes, commune de Verfeuil, aux affleu- rements de lignite. T. R.
<i>Buccinum</i> . N. S.	Gault. (Albien).	Pradon.
<i>Buccinum Gaultinum</i> ?, d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 233, fig. 1, 2, et <i>Prodr. alb.</i> , n° 197.	Gault. (id.)	Pradon.
<i>Dentalium</i> .	Turonien.	Rivières; — Saint-Jean-de- Maruéjols, arrondissement d'A- lais. C.

Lamellibranches.

<i>Teredo Requicnianus</i> , Matheron, 1843; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 348, fig. 3-6 et <i>Prodr. Tur.</i> , n° 93.	Calcaire gris (Turonien.)	Serre de Bernon, près Tres- que.
---	------------------------------	-------------------------------------

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Panopæa Prevosti</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 3, p. 334, pl. 356, fig. 3, 4, et <i>Prodr. apt.</i> , n° 87.	Aptien inférieur.	Laval-Saint-Roman; — Cournet, près Baron. T. C.
<i>Pholadomya Ligeriensis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 363, fig. 8, 9, et <i>Prodr. Cénom.</i> , n° 240.	Calcaire gris (Turonien).	Chusclan, montée du chemin de Saint-Etienne-des-Sorts.
<i>Venus Rhotomagensis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 385, fig. 1-5, et <i>Prodr. Tur.</i> , n° 109.	Gault. (Albien).	Pradon. T. C.
<i>Opis</i>	Gault. (Albien).	Pradon. R.
<i>Cyprina cordiformis</i> ?, d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 273, et <i>Prodr. alb.</i> , n° 237.	Aptien inférieur.	Très-commune à l'état de moule intérieur : Laval-Saint-Roman ; — Toulair ; — Trescouvieux ; — Cournet près Baron ; — Serviers, lit de la rivière de Seynes ; — Massepas.
<i>Cyprina Ervyensis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 3, p. 102, pl. 274, et <i>alb.</i> , 19, n° 238.	Gault et Cénomancien.	Pradon ; — Saut-du-Mulet, près la chartreuse de Valbonne.
<i>Cyprina Rhodani</i> ?, Pictet et Roux <i>Descript.</i> , pl. 34.	Cénomancien et Gault.	Pradon.
<i>Cyrena globosa</i> , Matheron, <i>Cat. méth.</i> , pl. 14, fig. 12-13.	Paulétien.	Orsan, quartier de la Pise, T. C. ; — Goudargues, au quartier de la Font-des-Ourières, près le hameau de Goussargues.
<i>Trigonia aliformis</i> , Park ; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 3, p. 143, pl. 291, fig. 1-3, et <i>Prodr. alb.</i> , n° 240.	Gault. (Albien).	Pradon. T. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<p><i>Trigonia crenulata</i>, Lamk.; d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 3, p. 151, pl. 295, et <i>Prodr. Cénom.</i>, n° 321.</p>	Cénomancien.	<p>Connaux, m^t de la Coste ; — Pradon, à l'état de moule intérieur, R. Banc-Rouge (Ardèche). C.</p>
<p><i>Trigonia quadrata</i>, Agass. C'est par erreur que d'Orbigny, <i>Prodr. Cénom.</i>, n° 322, assimile cette espèce au <i>T. Dædalea</i> Park. Dans le <i>T. quadrata</i> les côtes sont plutôt tuberculeuses, tandis que dans le <i>T. Dædalea</i>, Park., ce sont des séries de tubercules.</p>	Cénomancien.	Banc-Rouge (Ardèche).
<p><i>Trigonia sulcataria</i>, Lamk; d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 3, p. 150, pl. 294, fig. 5-9, et <i>Prodr. Cénom.</i>, n° 325.</p>	Cénomancien.	<p>Connaux, m^t de la Coste, T. C.; — Saint-Victor-la-Coste, à l'Ouest, sur la colline dite les Garrigues, C.; — Pradon, R.; Tresque, dans le parc. T. C.</p>
<p><i>Corbis aptiensis</i>, nobis. Cette espèce nous paraît avoir été confondue avec le <i>Corbis corrugata</i>, d'Orb., <i>Prodr. néoc.</i>, A, n° 299. M. d'Orbigny la considère comme néocomienne et la cite aussi remaniée au sein du terrain aptien; nous l'avons rencontrée communément dans l'étage aptien inférieur dans le département du Gard. Mais nous avons observé, sur les individus qui ont conservé une partie de leur test, qu'elle diffère sensiblement du <i>C. corrugata</i> néocomien: les plis sont en général moins gros et plus serrés; elle est aussi moins ventrue et plus déprimée. Ce sont ces différences qui nous ont engagé à en faire une espèce distincte et à la désigner sous un nom nouveau.</p>	Aptien infér.	<p>Fontarèche; — Massepas; — Laval-Saint-Roman, T. C.; — Courmet, près Baron, C. — Toulair, C.</p>